

Contractil®

ANTIHEMORROIDAL

**Fracción Flavonoide Purificada y Micronizada
Diosmina/Hesperidina (90:10) 500 mg**

Comprimidos Masticables

**Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO. Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES?

Cada comprimido masticable contiene: principios activos: Fracción Flavonoide Purificada y Micronizada* Diosmina/Hesperidina (90:10) 500,00 mg (corresponde a Diosmina 450,0 mg y Hesperidina 50,0 mg). Principios inactivos: manitol, sorbitol cristalino, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, esencia de frutilla, colorante rojo eritrosina laca aluminica (CI 45430:1), sucralosa.

Este medicamento es Libre de Gluten. Este medicamento contiene Eritrosina como colorante.

(*) La Fracción Flavonoide Purificada y Micronizada (FFPM) es obtenida mediante un proceso de micronizado que reduce el tamaño de las partículas. Este proceso aumenta la absorción de la FFPM mejorando la cantidad del medicamento que llega al sitio donde cumple su acción (biodisponibilidad). Esto conlleva a una mejoría más rápida y mayor de los signos y síntomas asociados con las hemorroides.

Acción: flebotónico, antihemorroidal.

¿Para qué se usa CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES?

• Ayuda a reducir los signos y síntomas asociados con hemorroides como secreción anal, picazón, dolor anal, enrojecimiento, inflamación anal. • Colabora a reducir la duración, intensidad y recurrencia de los episodios agudos relacionados a las hemorroides.

¿Qué personas no pueden utilizar CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES?

NO USE este medicamento si usted: • es alérgico al principio activo Fracción Flavonoide Purificada y Micronizada Diosmina/Hesperidina o a cualquiera de sus otros componentes. • Está embarazada o dándole el pecho a su bebé.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES?

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con **CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES** si Ud.: • está embarazada o sospecha que puede estarlo. No se aconseja la toma de este medicamento durante el embarazo. • Se encuentra dándole el pecho a su bebé. Se desaconseja la toma de este medicamento durante la lactancia. • Si está tomando otros medicamentos. • Si presenta mal funcionamiento del corazón y/o del riñón. • Presenta síntomas repentinos y severos o inusuales como dolor y sangrado. Éstos pueden ser síntomas de una trombosis venosa o de otra enfermedad. • Tiene hemorroides que se acompañan con sangrado rectal o si presenta cambios en la frecuencia de la defecación es importante que antes de tomar este medicamento consulte con su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Como todos los medicamentos **CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES** puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran.

Se han descrito algunos casos de alergia, malestar gastrointestinal leve, mareos, astenia, dolor de cabeza y reacciones cutáneas; en ese caso, discontinue el tratamiento y consulte a su médico.

¿Cómo se usa **CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES?**

Los comprimidos masticables de **CONTRACTIL®** se administran por vía oral. **CONTRACTIL® COMPRIMIDOS MASTICABLES** solo está aconsejado para ser consumido por adultos mayores de 18 años. Colocar el comprimido y disolverlo dentro de la boca. Puede ser tomado con o sin agua.

Para los episodios agudos relacionados con hemorroides: se utiliza 3 comprimidos masticables dos veces por día durante 4 días. Luego 2 comprimidos masticables dos veces por día durante 3 días más.

Día	Mañana 	Tarde 
1	3 comprimidos masticables	3 comprimidos masticables
2	3 comprimidos masticables	3 comprimidos masticables
3	3 comprimidos masticables	3 comprimidos masticables
4	3 comprimidos masticables	3 comprimidos masticables
5	2 comprimidos masticables	2 comprimidos masticables
6	2 comprimidos masticables	2 comprimidos masticables
7	2 comprimidos masticables	2 comprimidos masticables

Para el tratamiento extendido durante 2 meses: 1 comprimido masticable dos veces al día (mañana y tarde). Para su uso más allá de 2 meses, consultar con su médico de cabecera.

Si el episodio hemorroidal agudo persiste después de 7 días de uso, consulte con su médico.

Los cambios de hábitos ayudan también a reducir el riesgo de hemorroides como: cambios en la alimentación (menos consumo de alcohol y grasas animales), ejercicio regular, abundante hidratación, mantener un peso saludable, evitar la constipación, entre otros.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: • Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. • Hospital Dr. A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777. • Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115. • Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Conservación: conservar a temperatura ambiente menor a 25°C.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA)

ANMAT responde: 0800-333-1234

Presentación: envases conteniendo 20 comprimidos masticables.

**MANTENER ÉSTE Y OTROS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.726.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: **0800-333-3532** | **elea.com**

Fecha de última revisión: Agosto/2022

