

Contractil[®]F

Fenilefrina Clorhidrato - Pramoxina Clorhidrato Vaselina Sólida - Glicerina

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

Crema Rectal

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE APLICARSE
CONTRACTIL[®] F, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene CONTRACTIL[®] F?

Cada 100 gramos de crema rectal contiene:

Principios activos: Fenilefrina Clorhidrato 0,25 g, Pramoxina Clorhidrato 1 g, Vaselina Sólida 15 g, Glicerina 14,4 g.

Excipientes: gliceril monoestearato, propilenglicol, monoestearato de sorbitan, polisorbato 60, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.

Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción: antihemorroidal.

¿Qué es CONTRACTIL[®] F?

CONTRACTIL[®] F es una crema de suave consistencia que contiene principios activos como la Pramoxina y la Fenilefrina con acción antihemorroidal.

¿Para qué se utiliza CONTRACTIL[®] F?

Esta crema se utiliza para el alivio de múltiples síntomas relacionados con las hemorroides.

- Disminuye el dolor y la quemazón localizada en el ano.
- Ayuda a aliviar la picazón y el malestar anal asociado con las hemorroides.
- Disminuye y retrae temporalmente el tejido hemorroidal y alivia la sensación de quemazón.
- Proporciona un revestimiento para aliviar las molestias anorrectales.

- Protege la superficie anorrectal inflamada e irritada y colabora a tener una defecación menos dolorosa.

¿Qué personas no pueden aplicarse

CONTRACTIL[®] F?

NO USE este medicamento si usted:

- es alérgico a alguno de los principios activos o inactivos de la crema rectal.
- es menor de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de aplicar

CONTRACTIL[®] F?

Consulte a su médico si usted tiene:

- enfermedades del corazón.
- presión arterial alta (hipertensión arterial).
- depresión.
- problemas de la glándula tiroideas.
- diabetes.
- dificultad para orinar por enfermedad en la próstata.
- embarazo y durante el amamantamiento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicando CONTRACTIL[®] F?

Al igual que todos los medicamentos, CONTRACTIL[®] F puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran. Ocasionalmente, algunas personas, pueden presentar ardor en el ano.

Suspenda el uso y consulte con su médico en el caso de que tenga

sangrado por el ano, si los síntomas empeoran o no encuentra mejoría luego de una semana de tratamiento o si presenta mucho dolor durante la introducción del aplicador anal.

¿Cómo se utiliza CONTRACTIL® F?

CONTRACTIL® F es solo para uso tópico local en la región anal. Es decir que solo debe ser aplicado directamente sobre la zona afectada.

- Limpie el área afectada sin friccionar el lugar. Seque muy suavemente con un paño blando.
- Abra el tubo que contiene la crema, quitando la tapa. La primera vez que lo abra, debe perforar el sello de aluminio del extremo superior del envase.
- Coloque el aplicador plástico en el envase de la crema e insértelo con suavidad en el ano. Puede lubricar este aplicador antes de colocarlo si lo desea.
- Apriete el envase de la crema para que salga del aplicador plástico. Colocar la crema, además, sobre el área externa del ano.
- Aplicar en la zona afectada hasta 4 veces por día, especialmente por la noche, antes de acostarse, durante la mañana al levantarse o después de cada movimiento intestinal (después de defecar).
- Limpiar todo el aplicador después de cada uso y volver a colocar la tapa.

CONTRACTIL® F está indicado para adultos. Los menores de 12 años deben consultar a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si me apliqué más cantidad de la necesaria?

Si usted se ha aplicado más **CONTRACTIL® F** de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de "Pediatría Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital "A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Hospital de Niños Pedro Elizalde Tel.: (011) 4300-2115.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA)

ANMAT responde: 0800-333-1234

Presentación:

Envases conteniendo 20 gramos de crema.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación:

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C.

Verifique la fecha de vencimiento antes de utilizar cualquier medicamento.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.321.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | www.elea.com**



Fecha de la última revisión: Noviembre/2020

506368-00 1-vu-ep

Elea